

Über die Konstitution des Chinolingelb.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt von der

Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn

Von

Baboo Mehta

aus Savarkundla (Kathiawar)

Indien

BONN 1937

Referent: Prof. Dr. Robert W i z i n g e r
Korreferent: Prof. Dr. Dr. h. c. Paul P f e i f f e r.



Dem Andenken meiner lieben Mutter!

Meinem lieben Vater!

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. R. W i -
z i n g e r , auf dessen Veranlassung diese Arbeit ausgeführt wurde,
sage ich für seine wertvollen Anregungen und seine verständnisvolle
Hilfsbereitschaft meinen herzlichsten Dank.

Außerdem möchte ich auch an dieser Stelle meine Dankbarkeit
Ausdruck verleihen gegen „The Bhavnager State sowie Shriyut
Pattani Shishta Padarohan Smarak Fund“, die mir in großzügiger
Weise durch Gewährung der erforderlichen Mittel ermöglicht hat,
mein Studium in Deutschland durchzuführen.

Theoretischer Teil.

Nach den neuen Anschauungen über die Beziehungen zwischen Konstitution und Farbe, wie sie vor einigen Jahren von W. Dilthey und R. Wizinger¹⁾ entwickelt wurden, läßt sich die Gesamtheit der organischen Farbstoffe in sehr einfacher Weise in die Klasse der Farbfalze und der intramolekular ionoiden Verbindungen einteilen.

Diese Anschauungen lassen sich in folgender Weise kurz zusammenfassen:


In einem Farbfalz ist der Chromophor ein koordinativ ungesättigtes ionoides Einzelatom z. B. ein C- oder N- oder O-Atom²⁾. Das Ion kann sowohl positiv wie auch negativ geladen sein. Durch positivierende Auxochrome ($\text{CH}_3\text{O}-$, $\text{HO}-$, $\text{H}_2\text{N}-$, $(\text{CH}_3)_2\text{N}-$, usw.) wird der elektropositive Charakter verstärkt, und die Farbe eines positiven Ions mit koordinativ ungesättigtem Zentralatom vertieft und intensiviert. Durch negativierende Auxochrome oder Antiauxochrome ($-\text{NO}$, $-\text{NO}_2$, >C=O , $-\text{N}=\text{N}-$, >SO_2 u. a.) wird der elektro-negative Charakter verstärkt, und die Farbe eines negativen Ions mit koordinativ ungesättigtem Zentralatom vertieft und intensiviert. Die amphoteren Auxochrome ($\text{>C}=\text{C}<$, Aryle.) wirken sowohl in positiven wie in negativen Ionen mit koordinativ ungesät-

1. W. Dilthey und R. Wizinger: J.


2) Schwefel, Selen, Tellur u. a. Elemente können ebenfalls als Chromophor auftreten.

tigtem Zentralatom farbvertiefend. Sie erleichtern sowohl das Zustandekommen eines positiven wie eines negativen Ions. Maßgebend für die Art der elektrischen Ladung ist das andere Ion ³⁾).

Wirken nun in einer Verbindung mit zwei koordinativ ungesättigten Atomen z. B. in Verbindungen des Typs:



u. a. auf das eine koordinativ ungesättigte Atom Auxochrome, auf das andere aber Antiauxochrome ein, so entstehen je nach Zahl und Art der Auxochrome und Antiauxochrome ein schwächerer oder stärkerer elektrischer Gegensatz zwischen beiden Molekularhälften d. h. es entstehen Übergangsstufen zwischen:



In beiden Verbindungen bildet sich ein mehr oder weniger starkes Dipolmoment aus. Wir sprechen hier von intramolekular ionoiden Zustand ⁴⁾). Formel II darf jedoch nur benutzt werden für Dipole, bei denen der elektrische Gegensatz zwischen den beiden koordinativ ungesättigten Atomen so stark ausgeprägt ist wie zwischen Kation und Anion eines Farbsalzes. Eine solche Verbindung muß die Farbtiefe und die Farbinintensität eines Farbsalzes besitzen. Dies sind jedoch extreme Fälle. In der Mehrzahl der Fälle liegen Übergangsstufen vor, deren Farben umso tiefer und intensiver sind, je größer der elektrische Gegensatz im Molekül ist.

Es ist nun durchaus nicht nötig, daß die beiden koordinativ ungesättigten Atome unmittelbar nebeneinander liegen wie bei den Derivaten des Stilbens, Azobenzols usw. In komplizierten Fällen können sie sogar an weiter voneinander entfernten Stellen eines Moleküls liegen.

Durch diese Auffassung sind die Farben aller nicht salzartigen organischen Verbindungen verständlich, und es wird nun auch hier


3) R. Wizinger: Ztschr. angew. Chem. 39, 564 (1928).

4) Näheres hierüber s. R. Wizinger, Habilitationschrift. Bonn 1927. Ztschr. angew. Ch. 42, 669 (1929).

eine einfache Systematik ermöglicht.

Genau wie bei den Farbfalzen die Haupteinteilung erfolgte nach der Natur des koordinativ ungesättigten ionoiden Zentralatoms in Carbenium-, Azenium-, Oxeniumfalzen usw., so erfolgt sie auch hier nach der Natur des Paares koordinativ ungesättigter Atome, zwischen denen ein elektrischer Gegensatz herrscht (z. B. $=C=C=$, $-N=N-$ und $=C=O$)⁵⁾.

Durch Übertragung dieser Betrachtung auf die Derivate des Äthylens läßt sich zeigen, daß bei einer außerordentlich großen Zahl organischer Verbindungen die Farbe ihre Erklärung findet aus dem Vorliegen eines elektrischen Gegensatzes zwischen zwei koordinativ ungesättigten C-Atomen: also durch Übergangsstufen von



Es ist so gelungen, zahlreiche farbige Verbindungen, denen bisher recht verschiedenartige Chromophore zugeschrieben wurden, wie Nitrofogruppe, Nitrogruppe, gekreuzte Doppelbindungen usw. zu der einheitlichen großen Klasse der Äthylenfarbstoffe übersichtlich zusammenzufassen.




Es zeigte sich feinerzeit, daß alle Farbstoffe bekannter Konstitution sich nach den angeführten Grundsätzen einordnen ließen mit alleiniger Ausnahme des Chinolingelb.

Chinolingelb ist bekanntlich sulfuriertes Chinophtalon. Auf Grund der Untersuchungen von A. Eibner⁶⁾ wurde diesem die Konstitutionsformel I gegeben. Mit dieser Konstitutionsformel ist jedoch die recht intensive Farbe der Verbindung unvereinbar⁷⁾.

5) E. H. Bottke: Dissertation, Bonn 1931.

6) A. Eibner und H. Merkel: Ber. 35, 2297 (1902); Ber. 37, 3006 (1904). A. Eibner und K. Hofmann: Ber. 37, 3011 (1904). A. Eibner: Ch. Z. 28, 1206 (1904).

7) R. Wizinger: Organische Farbstoffe, 48, LVII (1933). R. Kuhn: Naturw. 20, 618 (1932); R. Kuhn u. F. Bär: Ann. 516, 155 (1935).




Als Farburfsache kämen nur in Betracht ein elektrifcher Gegenfatz in den Gruppen $=C=O$ und $=C=N-$. In einer Verbindung der angegebenen Struktur I kann jedoch diefer elektrifche Gegenfatz nur fchwach entwickelt fein. Dagegen ift die Farbe fofort deutbar, wenn wir dem gelben Chinophthalon eine toutomere Formel zufchreiben. Zwei toutomere Formeln find denkbar (II, III). In einer Subftanz der Formel II liegt die Enolform des Chinolyindandions vor. In der Doppelbindung ift das eine C-Atom negativiert durch eine Carbonylgruppe und den Chinolreft ($=C=N-$ ift ein Anti-auxochrom), das andere ift pofitiviert durch die Hydroxylgruppe. Der Benzokern fchwächt allerdings wegen der o-ftändigen Carbonylgruppe die pofitivierende Wirkung etwas ab. So kann alfo in einer folchen Subftanz das Dipolmoment in diefer Äthylengruppe nicht ftark fein. Demnach ift bei einer Verbindung diefer Konftitution nur wenig intensive Farbe zu erwarten. In einer Verbindung der Formel III wird in der die beiden Ringe verknüpfenden Doppelbindung das eine C-Atom durch zwei Carbonylgruppen ftark negativiert, das andere dagegen durch die Gruppe $-NH-$ und einen Styrylreft (amphoterer Auxochrom) pofitiviert. Hier ift alfo ein ftarkes Dipolmoment vorhanden; diefe Verbindung muß intensiv farbig

fein. Formel III würde also am besten die intensive Farbe des Chinophtalons erklären. ⁷⁾

Diese Formel läßt sich auch noch durch eine Reihe von Tatsachen stützen: ⁸⁾


Nach Formel I und II wäre das Chinophtalon Chinolyindandion (Keto- bzw. Enolform). Da der Chinolinrest negativierend wirkt, müßte das Chinophtalon ebenso leicht wie Indandion ein Alkalifalz geben. Dies ist aber nicht der Fall. Indandion gibt schon mit verdünnter wässriger Natronlauge ein rotes Salz, ja sogar mit Sodalösung. Das Chinophtalon bildet erst in absolutem Alkohol mit Alkoholat ein rotes Salz, das bereits durch die Luftfeuchtigkeit rasch zersetzt wird. Die Azidität des Chinophtalons ist also beträchtlich geringer als die des Indandions in bester Übereinstimmung mit Formel III.



Das Stickstoffatom ist hier zwar auch negativiert durch die Äthylengruppe mit den beiden Carbonylen, aber durch die Zwischenschaltung der Äthylengruppe wird die negativierende Wirkung stark abgeschwächt. Bekanntlich wird ganz allgemein die positiv- oder negativinduzierende Wirkung von Gruppen nur zu einem gewissen Bruchteil durch eine Äthylengruppe oder aromatischen Rest hindurchgelassen (vgl. z. B. $\text{O}_2\text{N}-\text{OH}$ und $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ oder $\text{CH}_3\text{CO}-\text{OH}$ und $\text{CH}_3\text{CO}-\text{CH}=\text{C} \begin{smallmatrix} \text{OH} \\ \text{CH}_3 \end{smallmatrix}$). Der Wasserstoff am Stickstoff muß also weniger fauer sein als der Wasserstoff des Indandions. Das Verhalten des Chinophtalons gegen starke Säuren, sowie gegen Brom läßt sich am besten unter Annahme von Formel III deuten.


Mit starken Säuren — konzentrierter Schwefelsäure, konzen-

trierter Bromwasserstoffsäure — entstehen tiefrote Salze ⁸⁾⁹⁾ mit Carbeniumchromophor.



Durch Wasser wird die Säure wieder abgespalten.

Mit Brom in Eisessig oder Chloroform entsteht ein orangefarbenes Tetrabromid vom Schmp. 235° C ⁹⁾. Drei von den Bromatomen sind perbromidartig gebunden. Mit Ammoniak entsteht aus dem orangefarbenen Tetrabromid Monobromchinophtalon, farblose Blättchen vom Schmp. 179° C. Beim Erhitzen verliert das Tetrabromid fein gefamtes Brom unter Rückbildung von Chinophtalon:






8) E. H. Bottke: Dissertation, Bonn 1931.



9) Eibner und O. Lange. Ann. 315, 311 (1901).

Es sei nachdrücklich darauf hingewiesen, daß das Bromchinophthalon, das eine der Eibner'schen Chinolingelbformel analoge Konstitution besitzt, farblos ist. Hätte das Chinolingelb tatsächlich den ursprünglich angenommenen Aufbau, so wäre zu erwarten, daß auch das Bromchinophthalon intensiv farbig wäre.

Diese Tatsachen sprechen eindeutig dafür, daß das Chinolingelb nicht die Chinophthalonformel hat mit einfacher Bindung zwischen Chinolinring und Indandionring, sondern daß eine Doppelbindung zwischen beiden Kernen vorliegen muß, die auf der Chinolinseite positiviert und auf der Indandionseite negativiert ist, so daß aus diesem Grunde Farbe auftritt.


Das Chinolingelb gehört also in die Reihe der Äthylenfarbstoffe. Zu der gleichen Gruppe wie das Chinolingelb gehören auch die Kondensationsprodukte von Aldehyden oder Ketonen mit Indandion, von denen St. v. Konstantieki und L. Laczowski ¹⁰⁾ sowie E. H. Bottke ⁸⁾ einige beschrieben haben z. B.





Diese kleine Zusammenstellung zeigt bereits deutlich, daß mit zunehmender Positivierung des einen C-Atomes die Farbe sich vertieft. Die Einführung von Dimethylaminogruppen bewirkt eine bathochrome Verschiebung des Farbtons von gelb nach intensiv blaurot.

R. K u h n und Fr. B ä r ¹¹⁾ gelang die Methylierung des Chino-lingelb. K u h n hatte angenommen, daß Chinolingelb die Enolstruktur (II) besitze, da die Chinophthalonformel (I) die Farbe nicht erklärte. Die Methylierung wurde durchgeführt durch Behandlung des festen scharfgetrockneten Natriumfalzes mit Dimethylsulfat in Xylol bei über 100° C. Gegen alle Erwartungen war das Produkt aber methoxylfrei. Erst unter den Bedingungen der Methylimidbestimmung wurde Jodmethyl abgespalten. Die Methylierung war also an Stickstoff erfolgt. Beim oxydativen Abbau wurde N-methyl- α -chinolon und Phthalsäure erhalten.



10) Ber. 30, 2138 (1897).


11) R. Kuhn: Naturw. 20, 618 (1932); R. Kuhn und Fr. Bär: Ann. 516, 155 (1935).

Das Methylchinolingelb, Schmp. 249° C, ist etwas tieffarbiger als das Chinolingelb. Dieser Befund stützt die von R. Wizinger abgeleitete Chinolingelbformel sehr einprägsam. Auch R. Kuhn kommt im Gegensatz zu seiner ursprünglichen Annahme zu dem Ergebnis, daß das Chinolingelb die Konstitution III besitzt. (Auf die Betrachtungen R. Kuhns über die Formulierung des Dipolcharakters soll hier nicht eingegangen werden).


Das Ziel dieser Arbeit bestand jetzt darin, das Gebiet weiter auszubauen und eine weitere Stütze für die Konstitution des Chinolingelb als Äthylenfarbstoff zu bringen. Der erste Schritt sollte sein, das N-methylchinolingelb in klarer Synthese aufzubauen.

(1) Ich versuchte auf folgende Weise die Synthese durchzuführen:


Chinolin wurde mit Benzoylchlorid und Kaliumcyanid in N-Benzoyl-2-cyandihydrochinolin übergeführt.




Hierbei ist es unbedingt nötig, die angegebenen Konzentrationen von Wasser und Benzoylchlorid genau einzuhalten (s. praktischer Teil), weil sich sonst ein Additionsprodukt von Benzoylchlorid an Chinolin bildet, das sich nur sehr schwierig vom N-Benzoyl-2-cyan-dihydrochinolin trennen läßt. Das N-Benzoyl-2-cyan-dihydrochinolin konnte nach D.R.P. 280 170 A. Kaufmann, FdI. 12 Teil 737. durch Behandlung mit Phosphorpentachlorid in 2-Cyanchinolin übergeführt werden:



Das 2-Cyanchinolin wurde umgesetzt zum 2-Cyanchinolinjodmethy-
lat durch zwölfstündiges Erwärmen mit Methyljodid in einer Druck-
flasche:




Das so gewonnene Produkt versuchte ich mit Indandion in al-
kalisch-alkoholischer Lösung zu kondensieren in der Erwartung, daß
sich folgender Vorgang vollziehen würde:




Allein, es wurden nur Kondensationsprodukte des Indandions
mit sich selbst gefaßt, wie Bis-, Tris- und Polyindandion. Die Kon-
densationsfähigkeit des Cyanchinolinmethyلات ist also zu gering.

(2) Ich schlug deshalb einen anderen Weg ein:


o-Nitrobenzaldehyd wurde unter den Bedingungen der bekann-
ten Perkinischen Zimtfäurelynthese in o-Nitrozimtfäure überführt,
diese in stark ammoniakalischer Lösung mit Ferrosulfat zu o-Amino-
zimtfäure reduziert:




o-Aminozimtfäure wurde durch Kochen mit konz. Salzfäure in Carbofätyril, und dieses mit Phospherpentachlorid in 2-Chlorchinolin übergeführt:



Durch Behandeln mit Methyljodid unter Druck wurde unter Austausch des Chlors gegen Jod das Jodmethylat des 2-Jodchinolins erhalten.




Äquimolekulare Mengen dieses Produktes und Indandion wurden nun in Methanol mit 2 Mol. Alkali erwärmt. Hier fand die erhoffte Kondensation tatsächlich statt:



Das N-Methylchinolingelb schied sich in schönen gelborangefarbenen Nadeln aus. Es zeigt einen Smp. von 247/48° C. Die Lösungen in organischen Lösungsmitteln zeigen gleichkonzentrierten Lösungen


des Chinolingelb gegenüber eine deutliche Verschiebung des Farbtons nach orange. Chinolingelb löst sich in konc. Schwefelsäure rot, N-Methylchinolingelb dagegen violettrot, also ebenfalls mit Farbvertiefung. Im festen Zustand fluoresziert N-Methylchinolingelb gelborange, das einfache Chinolingelb dagegen nur gelb.


Das auf diese Weise hergestellte N-Methylchinolingelb war reiner als das von R. K u h n durch Methylierung des Chinolingelb erhaltene Produkt. Die Methylimidbestimmung ergab innerhalb der Fehlergrenze exakte Werte, während K u h n nur etwa 90% der theoretischen Menge =N-CH₃ fand. Auch die übrigen Analysendaten stimmen sehr gut. Beim oxydativen Abbau mit konc. Salpetersäure wurde, wie zu erwarten war, N-Methyl- α -Chinolon und Phtalsäure erhalten.



Ich versuchte nun auf andere Weise das Methylchinolingelb zu isolieren. Chinolinjodmethylat sollte mit Indandionkalium zum N-methyldihydrochinolyl-indandion kondensiert und dieses etwa


Das Ziel dieser Arbeit bestand jetzt darin, das Gebiet weiter auszubauen und eine weitere Stütze für die Konstitution des Chino-






Als nun eine Lösung von Chinolinjodmethylat, Indandion und der berechneten Menge Kaliumhydroxyd in Methanol einige Tage stehen gelassen wurde, schieden sich rotorangefarbene Kristalle aus. Nach Umkristallisieren aus Pyridin zeigten sie einen Schmp. von 300° . In organischen Lösungsmitteln löste sich die Substanz rotorange, in konz. Schwefelsäure violettrot, und schied sich beim Verdünnen mit Wasser wieder aus, also mit tieferer Farbe als Methylchinolingelb. Diese Farbtöne machten es sehr wahrscheinlich, daß nicht das erwartete Dihydroprodukt vorlag, was wesentlich heller sein dürfte. Das Dihydroprodukt müßte außerdem mit konz. Schwefelsäure in Methylchinoliniumsalz und Indandion aufgespalten werden. Viel wahrscheinlicher war, daß selbsttätige Dehydrierung eingetreten war unter Bildung eines Isomeren des Methylchinolingelb.

Tatsächlich ergaben die Verbrennung und die Methylimidbestimmung Werte, welche sehr genau auf die Summenformel des Methylchinolingelb $C_{19}H_{13}O_2N$ stimmen. Der oxydative Abbau ergab einwandfrei Phtalsäure und N-Methyl- γ -chinolon, das als solches, sowie als salzsaures Salz und Quecksilberdoppelsalz identifiziert wurde. Es lag also das γ -Isomere des Methylchinolingelb vor:




Es muß in folgender Weise entstanden sein:




Im Gegensatz zum Hydroxylion wandert das Ion des Indandions so wie das Cyanion nach der γ -Stellung.

Um die angenommene Konstitution der Verbindung noch weiter zu sichern, wurde auch noch eine eindeutige Synthese durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde zunächst Chinolinjodmethylat mit Cyankalium in N-Methyl-4-cyanchinolan übergeführt und mit Jod in Pyridin zu 4-Cyanchinolinjodmethylat oxydiert ¹²⁾.




12) A. Kaufmann: Ber. 51, 119 (1918).

Zu einer Lösung dieses 4-Cyanchinolinjodmethylats in Methanol wurde eine Lösung von Indandion und 2 Mol. Kaliumhydroxyd hinzugegeben. Nach kurzem Erwärmen fiel ein kristalliner Stoff aus; das Reaktionsgemisch roch nach Blausäure. Demnach konnte man folgende Reaktion als beendet annehmen:



Das Reaktionsprodukt — rote Kristalle vom Smp. $314/15^\circ$ — zeigte aber nach den Analyseergebnissen aus der Methylimidbestimmung die Summenformel $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$. Das bedeutet, daß der erhaltene Körper HCN mehr enthält als der Formel des erwarteten 7-Isomeren des N-Methylchinolingelb ($\text{C}_{19}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$) entspricht. Der Mischschmelzpunkt mit dem Isomeren des Methylchinolingelb zeigte eine Depression von 30°C . Diese Verbindung enthält eine Cyangruppe die nichtionoid gebunden ist, denn ihre alkoholische Lösung gibt mit Silbernitrat keinen Niederschlag. Die Verbindung ist also das primäre Umsetzungsprodukt von Indandionkalium mit 4-Cyanchinolinjodmethylat und hat folgende Formel:



Die Verbindung ist gegen Säuren sehr beständig. Mit konc. Schwefelsäure gibt sie nur eine gelbe Halochromieerscheinung, während das Isomere des Methylchinolingelb sich mit intensiv rotvioletter Farbe löst.


Aus dem Filtrat der Kondensationsflüssigkeit fielen nach eintägigem Stehen noch weitere orange Kristalle aus, die bei 270 bis 275° C schmolzen (unscharf). Der Mischmelzpunkt des γ -Isomeren des Methylchinolingelb mit der eben beschriebenen Cyanverbindung war ebenfalls 270—275° C. Demnach war es sehr wahrscheinlich, daß hier ein Gemisch dieser beiden Stoffe vorlag und auch das erwartete Isomere des Methylchinolingelb sich gebildet hatte.

Um nun ausschließlich das γ -Isomere des Methylchinolingelb zu erhalten, wurden wiederum die beiden Komponenten kondensiert, diesmal aber unter Anwendung eines mäßigen Überschlusses an Alkali und unter Verlängerung der Reaktionsdauer auf etwa fünf Stunden.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß das γ -Isomere des Methylchinolingelb tiefer farbig ist als die α -Form. Das γ -Isomere des unmethylierten Chinolingelb ist noch unbekannt. Kondensationsversuche von Lepidin und Phtalsäureanhydrid waren erfolglos geblieben¹³⁾.


13) A. Eibner: Ber. 37, 3006/3011 (1904), Ch. Z., 28, 1206 (1904).

Nachdem nun festgestellt war, daß aus ein Chinolinjodmethylat beim Umsatz mit einer Verbindung mit reaktionsfähiger $--CH_2--$ Gruppe in alkalisch-alkoholischer Lösung entstehendes Äthanderivat sich von selbst zum Äthylenderivat dehydriert, wurde versucht, ob nicht auch andere Stoffe mit aktiver Methylengruppe in gleicher Weise reagieren würden. Die Stoffe mit aktiver Methylengruppe enthalten fähtliche negativierende Gruppen, sodaß die erwarteten Äthylenderivate



mehr oder weniger tieffarbig fein müssen, z. T. sogar ausgesprochene Farbstoffcharakter besitzen müssen.


Tatfächlich führten die Versuche in mehreren Fällen zum erwarteten Erfolg. Es wurde stets so gearbeitet, daß äquimolekulare Mengen Chinolinjodmethylat und Methylene Verbindung mit 1 Mol. Kaliumhydroxyd in Methanol gelöst bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen wurden, bis ein Reaktionsprodukt sich ausgeschieden hatte. So wurden mit Nitromethan und mit Cyaneffigester folgende Verbindungen gefaßt:



In Anal. gie mit dem Umsetzungsprodukt aus Indandion wird hier mit V o r b e h a l t angenommen, daß die Reaktion in γ -Stellung stattgefunden hat.

Die Verbindung aus Nitromethan (N-Methyl-nitromethylen-dihydrochinolin) bildet intensiv gelbe Nadeln vom Smp. 211° C. Sie scheidet sich im Laufe von drei bis vier Tagen aus der Reaktionsflüssigkeit aus.


Die Verbindung aus Cyanessigsäureester ist intensiv gelb-orange — Smp. 152° C —. Sie zieht aus schäumendem Seifenbade in schönen orangegelben Tönen auf Acetatide. Diese Verbindung entsteht langsamer als diejenige aus Nitromethan. Nach 8—10 Tagen setzt sich aus der Lösung der Komponenten ein Gemisch einer farblosen und einer orangegelben Substanz ab. Die farbige Verbindung, das Äthylenderivat, läßt sich durch Extrahieren mit heißem Methanol herauslösen. Die farblose schwerer lösliche Verbindung ist das entsprechende noch nicht dehydrierte Äthanderivat (Smp. 194°). Bei längerem Liegen an der Luft oxydiert es sich langsam zum orangegelben Äthylen:



Hier ist es also möglich, die einzelnen Reaktionsstufen bequem zu beobachten.

Beim Umlatz von Malonsäureester mit Chinolinjodmethylat verlief die Reaktion in anderer Richtung. Die Komponenten wurden wie stets mit der entsprechenden Menge Kaliumhydroxyd bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Nach einigen Tagen schieden sich tiefrote Nadeln mit schwarzgrünem Oberflächenglanz aus, die sich aus heißem Wasser oder Methanol umkristallisieren ließen (Smp. 235/36° u. Zerf.). Die Verbindung ist in Äther und Benzol nur spurenweise löslich, löslich dagegen in Wasser, Alkohol, Eisessig, Pyridin. Die Farbe der Lösung ist rot bis rotviolett. In konc. Schwefelsäure löst sich die Verbindung fast farblos. Eigenschaften und Analyseergebnis:

nisse zeigen, daß sich Dimethylethyroapocyaninhydrojodid gebildet hat: ¹⁴⁾




Diese Verbindung war bisher von A. Kaufmann und P. Strübin in nicht ganz reiner Form erhalten worden. Gut untersucht und eindeutig aufgeklärt ist das Äthylhomologe (W. H. Mills und H. G. Ordish ¹⁵⁾).

Bei dieser Reaktion hat der Malonester nicht die Rolle einer Reaktionskomponente gespielt. Vielmehr scheint er die Funktion eines Puffers für die OH-Ionenkonzentration ausgeübt zu haben. Bei Versuchen, die Synthese des Dimethylethyroapocyanins ohne Gegenwart von Malonester durchzuführen, gelang es in den allermeisten Fällen nicht, kristalline Substanzen zu erhalten. Es entstanden vielmehr nur schmierige Produkte, aus denen kein reiner Farbstoff zu gewinnen war.

Ich übertrug nunmehr die gleiche Arbeitsweise wie bei Chinolinjodmethylat auf N-Methylchinaldiniumsalze und N-Methylpyridiniumsalze. Wie erwartet, fand auch hier Kondensation und Dehydrierung statt. Beim Stehenlassen einer methylalkalischen Lösung äquimolukularer Mengen von N-Methylchinaldinmethylsulfat, Indandion und Kaliumhydroxyd entstand das α -Methylhomologe des γ -Isomeren des Methylchinolingelb:


¹⁴⁾ A. Kaufmann und P. Strübin: Ber. 44, 641 (1911).

¹⁵⁾ W. H. Mills and H. G. Ordish: Soc. (1928), 81.



Die Reaktion verläuft etwa mit der gleichen Geschwindigkeit wie beim Chinolinjodmethylat. Die Verbindung bildet gelborange Kristalle vom Smp. 285° C. Die Ausfärbung auf Acetatseide ist etwas gelbtlicher als diejenige (gelborange) des γ -Isomeren des Chinolingelb.


Wesentlich langsamer geht die Bildung der Äthylenfarbstoffe in der Pyridinreihe vor sich. Aus Pyridinjodmethalyt und Indandionkalium wird erst in 8—10 Tagen der erwartete Stoff erhalten:



Diese Verbindung ist schön gelb; der Schmelzpunkt liegt bei 353° C. R. K u h n ¹¹⁾ erhielt durch Methylieren des Natriumfalzes des Pyrophtalon das N-Methylpyrophtalon. Das Pyrophtalon schmilzt bei 290° C, das N-Methylpyrophtalon bei 165° C. Es ist also von obigem Produkt verschieden, so daß angenommen werden muß, daß hier, wie bei der Chinolinreihe das γ -Isomere entstanden ist.

Schließlich wurde auch Pyridinjodmethylat mit dem Kaliumfalz des Phenylmethylpyrazolons zusammengebracht. In diesem Falle dauert es etwa 2 Monate, bis die Dehydrierung beendet ist:


Das entstandene Pyrazolonderivat




bildet schöne zitronengelbe Nadeln vom Smp. 255° C. In konc. Schwefelsäure löst es sich farblos, fällt aber beim Verünnen wieder aus.

Es läge nahe, die Reaktion noch auf andere Stoffe mit aktiver Methylengruppe, ferner auf andere Heterozyklen wie Thiazole, Akridinderivate u. a. stark positivierte Carbeniumsalze zu übertragen, ferner wäre es zweckmäßig nach geeigneten Dehydrierungsmitteln zu suchen, um die Reaktionsdauer abzukürzen und auch die Ausbeute zu erhöhen. Dies hätte jedoch den Rahmen meiner Untersuchung weit überschritten, deren Aufgabe es ist, einen Beitrag zur Konstitution des Chinolingelb zu liefern.

Da das Bromchinophtalon, bei dem das Brom sich am Indandionkohlenstoff befindet, farblos ist, steht zu erwarten, daß die entsprechende Methylverbindung ebenfalls farblos ist:




Diese Verbindung wäre ein Isomeres des N-Methylchinolingelb. Ich unternahm eine Reihe von Versuchen, um dieses Isomere zu synthetisieren. Ich ließ α -Chlorchinolin unter verschiedenen Bedingungen auf Methylindandion bzw. sein Kaliumsalz einwirken, in der Hoffnung folgenden Umsatz zu erzwingen:




Allein trotz weitgehender Abänderungen der Versuchsbedingungen (f. exper. Teil) trat die Kondensation nicht ein. Beim Arbeiten in methylalkoholisch-alkalischer Lösung wurden nur Carbostyril und Selbstkondensate des Methylindandions gefaßt. Auch mit Indandion selbst kondensiert das α -Chlorchinolin nicht. Es bilden sich vielmehr eine ganze Reihe von Selbstkondensaten des Indandions (Bis-, tri- und Polyindadion; näheres f. exper. Teil).

In der Hoffnung, mit α -Piperidinochinolin besser Erfolg zu haben, synthetisierte ich diese Verbindung durch Erhitzen von α -Chlorchinolin mit Piperidin:




Das α -Piperidinochinolin bildet farblose Blättchen vom Smp. 55°C . Sein Jodmethylat zeigte leichten Gelbflich.

Aus α -Cyanchinolin und Piperidin wird bemerkenswerterweise kein Piperidinochinolin erhalten, sondern unter glatter Verseifung der Cyangruppe Chinaldinsäure:



Vermutlich entsteht zunächst durch Anlagerung von Piperidin an die Cyangruppe ein Amidin.

In diesem Zusammenhang stellte ich auch noch das bisher ebenfalls unbekannte Jodmethylat des γ -Piperidinochinolins dar durch Umsatz von 4-Cyanchinolinjodmethylat mit Piperidin:



Dieses Salz ist deutlich gelb; die Lösungen zeigen intensive grüne Fluoreszenz.

Die Kondensationsversuche von α -Pyperidinochinolin mit Methylindandion verliefen leider ebenfalls ergebnislos.

Zum Schluß versuchte ich noch durch Einwirkung von Methylmagnesiumbromid auf Bromchinophtalon das voraussichtlich farblose Methylchinophtalon zu erhalten. Es entstand jedoch ein Gemisch von Chinolingelb und N-Methylchinolingelb. Bemerkenswert ist, daß auch bei Einwirkung von Methylmagnesiumbromid auf Chinolingelb in mäßiger Ausbeute N-Methylchinolingelb erhalten wurde. Die Reaktionsbedingungen waren dabei so, daß nicht etwa unverbrauchtes Brommethyl die Methylierung herbeigeführt haben kann.

Es ist beabsichtigt, weitere ganz andersartige Wege zur Synthese des C-Methylchinophtalons zu beschreiten.

Experimenteller Teil.

Methylindandion

(vgl. W. Wislicenius und A. Kötzle A. 252, 80, 1889).

1 Mol. Natriumdraht (23 g) wird mit 0,5 Mol. (110 g) Phtaläurediäthylester im Ölbad auf 120° erhitzt, und dann 60 g (d. h. etwas mehr als ein Mol.) Propionäuremethylester hinzugefügt. Man erhitzt etwa 5 Stunden lang. In dieser Zeit verwandelt sich das Gemisch in eine rote breiige Masse. Durch Auskochen mit Äther wird der unverbrauchte Propionäure- und Phtaläureester, sowie der im Laufe der Reaktion gebildete Kohlenäureester entfernt, während das Natrium Salz des Methylindandions ungelöst zurückbleibt. Dieses ist zunächst noch durch verschiedene andere Salze (phtaläures Natrium u. a.) verunreinigt. Durch Auskochen mit hinreichend Alkohol wird es in Lösung gebracht; die Verunreinigungen bleiben ungelöst. Die alkoholische Lösung wird bis zur beginnenden Kristallisation eingedampft; beim Abkühlen scheidet sich das Methylindandionnatrium in schönen roten Kristallen aus. Das Salz wird in kaltem Wasser gelöst, die Lösung im Scheidetrichter mit Äther überschichtet und unter Schütteln verd. Salzsäure in kleinen Anteilen zugegeben. Das freie Keton wird vom Äther aufgenommen. Die ätherische Lösung wird mit geglühtem Natriumsulfat getrocknet und dann das Keton durch Eindampfen isoliert. Durch Vacuumdestillation — Sdp. 145 bis 148°/18 mm — wird es völlig gereinigt. Das Produkt läßt sich auch durch Umkristallisieren aus Ligroin reinigen. Ausbeute 25 g (35%). Farblose Kristalle Smp. 85° C.

N-Benzoyl-1.2-dihydro-2-cyanchinolin.

20 g frisch destilliertes Chinolin werden durch energisches Schütteln in etwa 40 ccm Wasser fein verteilt, und dann 10 g pulverisiertes Kaliumcyanid zugegeben. Darauf gibt man unter dauerndem Schütteln Benzoylchlorid in kleinen Anteilen zu. Durch Kühlen mit Eis sorgt man dafür, daß die Temperatur 10—15° C. keinesfalls überschreitet. Beim Zusatz von Benzoylchlorid tritt zunächst gelbe bis orange Farbe auf (N-Benzoylchinoliniumchlorid), die jedoch nach kurzer Zeit verschwindet (Bildung des nicht ionisierten Cyanids). Sollte nach einiger Zeit die gelbe Farbe nicht verschwinden, so ist der Versuch mißlungen. Die angegebenen Bedingungen und Konzentrationen sind daher genau einzuhalten. Man setzt solange Benzoylchlorid zu, bis die Masse halbfest geworden ist. Dies ist nach Zusatz von 20—25 g Benzoylchlorid der Fall. Sodann wird die Masse 3—4mal mit Wasser durchgeschüttelt und die wässrige Lösung abgegossen; anschließend wird ebenfalls 3—4mal mit verd. Salzsäure behandelt. Dabei wird das Reaktionsprodukt völlig fest. Es wird nun abgeseigt und mit Äther durchgeschüttelt, bis die feste Masse zu einem feinen weißen Pulver zerfallen ist. Das Rohprodukt zeigt einen Schmelzpunkt von 140—145° C. Weitere Reinigung durch Umkristallisieren aus Alkohol. Smp. des reinen Produktes 154/55°. Lange farblose Prismen. Ausbeute an Rohprodukt 22 g, an Reinprodukt 16 g.

2-Cyanchinolin.

(vgl. D. R. P. 280 173 Frdl. 12, 737).

10,5 g Benzoylcyanidihydrochinolin werden in 100 ccm Chloroform oder Benzol (wasserfrei) gelöst, und allmählich 8,5 g Phosphor-pentachlorid in die Lösung eingetragen. Es entwickelt lebhaft Salzsäuregas, während die Flüssigkeit dunkelrot wird. Man kocht auf dem Wasserbad unter Rückflußkühlung, bis die Salzsäureentwicklung aufgehört hat (5—6 Stunden). Sodann destilliert man unter gewöhnlichem Druck das Lösungsmittel ab und erhitzt darauf im Vacuum. Zunächst geht abgespaltenes Benzoylchlorid über und dann bei

160—70°/16mm das Cyanchinolin. Es erstarrt in die Vorlage in Form schöner langer weißer Nadeln. Es läßt sich durch Umkristallisieren aus Ligroin völlig reinigen. Smp. 94—96°. Ausbeute 4 g.

N-Methyl-2-cyanchinoliniumjodid.

15,4 g 2-Cyanchinolin und 15 g Methyljodid werden in einer kleinen Druckflasche 12 Stunden auf dem Wasserbad erhitzt. Das Reaktionsprodukt wird mit Äther aufgenommen, wobei das unveränderte Cyanchinolin in Lösung geht, und abgefaugt. Das 2-Cyanchinolinjodmethyolat bildet braune Kristalle, die in Wasser oder Methanol mit gelbbrauner Farbe löslich sind. Smp. 170°. Ausbeute 5 g.

31,32 mg Sbft. 2,55 ccm N₂; t = 23°; p = 765 mm.
 C₁₁H₉N₂J: Ber. N 9,47%
 Gef. N 9,45%

o-Nitrozimtsäure.

(Die Vorschriften für o-Nitro- und o-Aminozimtsäure stützen sich auf die Angaben von S. Gabriel. Ber. 14, 831 und Ber. 15, 2299, bringen aber einige Verbesserungen).

150 g o-Nitrobenzaldehyd werden mit 150 g frisch destilliertem Essigsäureanhydrid und 50 g geschmolzenem Natriumacetat in einem mit Steigrohr versehenen Kolben 8—10 Stunden lang auf dem Ölbad zu gelindem Sieden erhitzt. Die noch warme Reaktionsmasse wird unter Umrühren in vier Liter Wasser gegossen. Sie erstarrt dabei größtenteils kristallin. Es wird abgetaucht, mit Wasser nachgewaschen und dann mit starker Sodalösung behandelt. Die Nitrozimtsäure geht als Natriumfals in Lösung; die Verunreinigung bleiben als teerartiges Öl ungelöst. Die Lösung wird hiervon abfiltriert, und aus dem Filtrat die o-Nitrozimtsäure mit Salzsäure ausgefällt. Das Präparat ist nach dem Trocknen zur Weiterverarbeitung durchaus rein genug. Farblose Kriställchen, Smp. 230°, Ausbeute 175 g.

o-Aminozimtsäure.

175 g *o*-Nitrozimtsäure werden in 25%igem Ammoniak gelöst; andererseits wird zu einer warmen Lösung von 1600 g Ferrosulfat in 7 l Wasser soviel konc. Ammoniak gegeben, bis nicht mehr ausfällt. Die Lösung der *o*-Nitrozimtsäure wird unter gutem Rühren zum Ferrohydroxydschlamm zugegeben und das Ganze eine Stunde stehen gelassen. Der anfängliche grünliche Schlamm wird allmählich schwarzbraun. Sodann wird abfiltriert, der dunkle Schlamm mit Wasser ausgekocht und die vereinigten Filtrate auf etwa 7 l eingengt. Die Lösung wird vorsichtig solange mit Salzsäure versetzt als noch ein Niederschlag erfolgt; ein Überschuß ist zu vermeiden, da sich sonst das salzsaure Salz der *o*-Aminozimtsäure bildet. Man faugt die ausgefallene Säure ab. Das Filtrat wird mit Ammoniak alkalisch gemacht und weitgehend eingengt. Auf Zusatz von Salzsäure fällt noch einmal etwas Aminozimtsäure aus. Die rohe Säure wird durch Umkristallisieren aus heißem Wasser gereinigt und bildet dann schöne lange gelbe Nadeln Smp. 158°. In kaltem Wasser wenig, in heißem Wasser gut löslich; Ausbeute 85 g reine Säure. Mit konc. Salzsäure entsteht ein farbloses Chlorhydrat vom Smp. 188°.

Carbostyryl

(vgl. Ber. 13, 2070, 1880; Beilstein XX, 77).

88 g *o*-Aminozimtsäure und 70 ccm 25%ige Salzsäure werden 10 Stunden am Rückflußkühler erhitzt. Das nach dem Erkalten ausfallende Produkt wird abfiltriert und getrocknet. Smp. des Rohproduktes ca. 192°. Das Rohprodukt kann ohne weiteres zur Darstellung des 2-Chlorchinolins verwandt werden. Ausbeute 48 g.

Aus heißer konc. wässriger oder alkoholischer Lösung werden farblose Prismen vom Smp. 195° erhalten. Es läßt sich auch durch Sublimation reinigen. Das so dargestellte Präparat ist wasserfrei. Aus verd. wässriger Lösung scheidet es sich mit einem Mol Kristallwasser aus.

2-Chlorchinolin

(vgl. Ber. 15, 333, 1882).

14,5 g Carbofityril und 22 g Phospherpentachlorid werden sechs Stunden im Ölbad auf 130—140° erhitzt. Dann wird das rote ölige Reaktionsgemisch in Wasser gegossen. Es wird mit Natronlauge neutralisiert; dabei geht das Öl in den kristallinen Zustand über. Bei der anschließenden Wasserdampfdestillation geht das Chlorchinolin als farblose ölige Flüssigkeit über. Beim Stehen über Nacht wird es fest und kristallin. Durch Umkristallisieren aus heißem verdünnten Alkohol erhält man ein völlig reines Produkt. Farblose Nadeln. Smp. 97—98°, Sdp. 267°. Ausbeute 10 g.

2-Jodchinolinjodmethylat

(vgl. Ann. 282, 376).

12,8 g 2-Chlorchinolin und 10,5 g Jodmethyl werden in einer kleinen Druckflasche 3 Stunden auf dem Wasserbad erhitzt. Das größtenteils kristalline Reaktionsprodukt wird mit Äther angerührt und abgefaugt. Durch Umkristallisieren aus Methanol werden gelbe Nadeln erhalten. Smp. 203°. Ausbeute 9 g.

Bei dem Umsatz hat außer der Anlagerung von Jodmethyl ein Ersatz des Chlors durch Jod stattgefunden.

Chinolinjodmethylat

(vgl. A. Kaufmann, Ber. 42, 3779; 1909).

24 g frisch destilliertes Chinolin (rein! Kahlbaum) werden mit der gleichen Gewichtsmenge Benzol vermischt und 25 g Jodmethyl zugegeben. Am anderen Morgen hat sich das Chinolinjodmethylat als harte Masse ausgeschieden. Diese wird gepulvert, mit Äther gut ausgewaschen und sodann aus Methanol umkristallisiert.

Gelbe Kristalle. Smp. 76°. Sehr leicht löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Eisessig, unlöslich in Benzol und in Äther.

N-Methyl-4-cyanchinolan.

(vgl. A. Kaufmann, Ber. 42, 3780; 1909).

40 g Chinolinjodmethyolat werden in 80 g Wasser gelöst, im Scheidetrichter mit 200 ccm Äther überlichtet und eine konzentrierte Lösung von 10 g Kaliumcyanid in kleinen Anteilen unter Schütteln zugegeben. Das sich milchig auscheidende Cyanchinolan löst sich sofort in Äther. Die ätherische Lösung wird zuerst gelb, dann olivengrün, manchmal auch braun. Nach der Zugabe des Kaliumcyanids wird die ätherische Lösung sofort abgetrennt. Es scheidet sich zwar beim Stehen innerhalb von etwa anderthalb Stunden noch eine harzige Masse aus, die vielleicht im wesentlichen aus Cyanchinolan besteht, aber bei der gemeinfamen Ausarbeitung mit dem zuerst gewonnenen Anteil, das Auskristallisieren des reinen Cyanchinolan verhindert.

Die ätherische Lösung wird mit Kaliumkarbonat oder geglühtem Natriumsulfat getrocknet und dann durch Überfaugen eines scharf getrockneten Luftstromes eingeengt. Es scheiden sich schöne lange farblose Nadeln von Cyanchinolan ab neben braunem Öl, das an der Gefäßwandung festhaftet. Man saugt die Kristalle ab und wäscht mit wenig trockenem Äther nach. Ausbeute an reiner Substanz 9 g. Smp. 80°.

4-Cyanchinolinjodmethyolat.

(vgl. A. Kaufmann, Ber. 51, 119; 1918)

8,5 g N-Methyl-4-cyanchinolan werden in der doppelten Gewichtsmenge trockenem reinen Pyridin gelöst und auf einem Schuß unter Umschütteln eine kalte Lösung von 12,7 g Jod in 100 ccm Alkohol eingegossen. Es tritt eine ziemlich starke Selbsterwärmung ein, und allmählich scheiden sich rote Kriställchen aus. Man läßt über Nacht stehen, saugt dann ab und wäscht mit wenig Alkohol nach. Sodann wird zweimal aus Alkohol umkristallisiert. Ausbeute bei Anwendung von reinem Chinolan 9 g, sonst sehr wechselnd. Rote Kriställchen, Smp. 215° unter Zersetzung.

N-Methylchinolingelb.

4 g 2-Jod-chinolinjodmethylat, 1,43 g Indandion und 1,14 g Kaliumhydroxyd werden in ca 100 ccm Methanol gelöst, und die Lösung 4-5 Stunden auf dem Wasserbad erwärmt. Dabei wird die Flüssigkeit allmählich tiefrot. Man läßt über Nacht bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Am anderen Morgen haben sich schöne lange orangegelbe Nadeln ausgeschieden, die einen Schmelzpunkt von 245° zeigen. Durch Auflösen in möglichst wenig Chloroform bei gewöhnlicher Temperatur und Zufetzen von Methanol bis zur beginnenden Kristallification kann die Substanz weiter gereinigt werden.

Lange orangegelbe Nadeln. Smp. 247-248°. Unlöslich in Wasser, etwas löslich in Methanol, gut löslich in Eisessig, Chloroform, ziemlich gut in Pyridin. Wenig löslich in Benzol, Äther, Ligroin.

Die Lösungen sind orangegelb. Gegenüber gleichen konzentrierten Lösungen von Chinolingelb ist eine deutliche Farbvertiefung vorhanden. In festem Zustand fluoresziert das N-Methylchinolingelb gelborange, das Chinolingelb nur gelb.

4,967 mg Sbst.: 14,445 mg CO₂ und 2,020 mg H₂O
 C₁₉H₁₃O₂N: Ber: C = 79,44% H = 4,53%
 Gef. C = 79,37% H = 4,55%.

3,511 mg: 2,980 mg AgJ.
 Ber. —NCH₃ = 5,22%
 Gef. —NCH₃ = 5,42%.

Oxydativer Abbau.

0,5 g N-Methylchinolingelb wurden mit 20 ccm verd. Salpetersäure (1 Tl. konz. Salpetersäure : 2 Tl. Wasser) kurze Zeit auf dem Wasserbad erhitzt, bis alles in Lösung gegangen war. Die saure Lösung wurde nach dem Abkühlen mit Äther ausgeschüttelt. Aus der ätherischen Lösung schieden sich beim Einengen farblose Kristalle aus, die durch Schmelzpunkt und Reforcinprobe als Phtalsäure identifiziert wurden.

Die ausgeätherte saure Lösung wurde vorsichtig mit festem Kaliumhydroxyd alkalisch gemacht. Diese Lösung wurde auf dem

Wasserbad bei gewöhnlichem Druck soweit als möglich eingengt, und der Rest des Wassers im Vacuum (Siedekapillare!) bei 40-45° vollständig übergetrieben. Der trockene Rückstand wurde mit ganz trockenem Äther extrahiert. Die ätherische Lösung wurde mit Natriumsulfat getrocknet und eingedunstet. Es blieb eine geringe Menge eines braunen Öls, das sich bei 180°/15 mm überdestillieren ließ. Das Destillat erstarrte nach etwa achttägigem Stehen kristallin und zeigte dann einen Smp. von 70° (reinstes N-Methylchinolon 72°), in alkoholischer Lösung entstand mit Merkurichlorid ein weißer Niederschlag, der den für das Additionsprodukt von Merkurichlorid an Methylchinolon (Decker, J. Pr. 2, 47, 35) charakteristischen Smp. von 188° aufweist.

γ-Isomeres des N-Methylchinolingelb.
(γ-Phtaloylmethylen-N-methyldihydrochinolin)

Zu einer Lösung von 5,5 g Chinolinjodmethylat in 20 ccm Methanol wird eine Lösung von 3 g Indandion und 1,14 g Kaliumhydroxyd in 25 ccm Methanol hinzugegeben. Man läßt 5 Tage bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Nach dieser Zeit haben sich orangefarbene Kristalle ausgeschieden. Sie werden abgeseugt, mit Methanol ausgewaschen und aus Pyridin umkristallisiert. Ausbeute 1,5 g.

Orangerote Kriställchen. Smp. 300°. Leicht löslich in heißem Pyridin und heißem Methanol, mäßig löslich in kaltem Pyridin, wenig in kaltem Methanol. Leicht löslich in Chloroform und in Eisessig. Schwer löslich in Benzol, Äther, Ligroin, spurenweise löslich in Wasser. Die Farbe der Lösungen ist orangerot; mit der gleichen Farbe fluoresziert das feste Präparat. In konz. Schwefelsäure violettrote Halochromie.

5,00 mg Subst. 14,525 mg CO₂, 1,950 mg H₂O
C₁₉H₁₃O₂N: Ber. C = 79,44% H = 4,53% N = 4,89%
Gef. C = 79,20% H = 4,34% N = 4,88%
4,230 mg: 3,440 mg AgJ.
Ber. =NCH₃ = 5,22%
Gef. =NCH₃ = 5,20%.

Oxydativer Abbau.

1,5 g Substanz wurden mit 20 ccm verd. Salpetersäure (1 Tl. konc. Salpetersäure, 2 Tle. Wasser) kurze Zeit auf dem Wasserbad erwärmt, bis alles mit orangegelber Farbe gelöst war. Die saure Lösung wurde nach der Abkühlung mit Äther ausgeschüttelt. Aus der ätherischen Lösung schieden sich beim Einengen farblose Kristalle aus, die durch den Schmelzpunkt (195° unter Aufschäumen) und durch die Reforcinprobe als Phtalsäure identifiziert wurden.

Die ausgeätherte saure Lösung wurde vorsichtig mit festem Kaliumhydroxyd alkalisch gemacht und dann zunächst bei gewöhnlichem Druck auf dem Wasserbad soweit als möglich eingengt. Schließlich wurde im Vacuum bei 40–50° (Siedekapillare) das Wasser restlos übergetrieben. Der trockene Rückstand wurde mit Chloroform extrahiert. Nach dem Verdampfen des Chloroforms blieb eine braune ölige Masse zurück. Diese wurde mit Benzol behandelt, die benzolische Lösung von ungelöstem dunklem harzigem Rückstand abgetrennt und eingengt. Dabei schieden sich gelbbraune Nadeln ab vom Smp. 160–65°. Die Verbindung löste sich leicht in Wasser. Aus der konzentriert-wässrigen Lösung fiel auf Zusatz von Salzsäure das salzsaure Salz. Das Rohsalz wurde in Methanol gelöst und durch Zusatz von Äther wieder ausgefällt. Es schied sich zunächst amorph aus und ging nach mehrtägigem Stehen in den kristallinen Zustand über. Gelbbraune Nadeln von Smp. 180–82°.

Mit Quecksilberchlorid gab die wässrige Lösung der Kristalle bei gewöhnlicher Temperatur einen gelben Niederschlag, der sich aus heißem Wasser umkristallisieren ließ und dann einen Smp. von 190° zeigte. Mit Platinchlorwasserstoffsäure entstand ein schwer lösliches Chloroplatinat von Smp. 210°. Durch diese Reaktionen ist festgestellt, daß N-Methyl- γ -chinolon (N-Methylkynurin) vorlag.

N-Methyl- γ -cyandihydrochinolin-indandion.

3 g N-Methyl-4-cyanchinolinjodid wurden in 20 ccm Methanol gelöst, und zu dieser Lösung eine solche von 1,4 g Indandion und 1,4 g Kaliumhydroxyd in 25 ccm Methanol zugegeben. Wurde

diefes Gemifch einige Minuten auf dem Waſſerbad erwärmt, fo trat Blaufäuregeruch auf, und gelborange Kristalle fielen aus. Es wurde deshalb angenommen, daß die Kondenfation unter Abfpaltung von Kaliumjodid und Blaufäure beendet ſei: Die Kristalle wurden abgefaugt, mit Methanol nachgewaſchen und umkriſtallifert durch Auflöſen in wenig kaltem Chloroform und Zugabe von Methanol. Auch Pyridin erwies ſich zum Umkriſtallisieren geeignet.

Lange haardünne rote Nadeln. Smp. $314/15^{\circ}$: Unlöslich in Waſſer, wenig in kaltem Methanol und in Äther, löslich in Benzol, Eiſſig, Pyridin, Chloroform. Die Löſungen ſind je nach Konzentration gelborange bis rotorange. Die Löſung in konc. Schwefelfäure iſt gelb. Das Ergebnis der Analyſen zeigte, daß nicht das erwartete γ -Homere des N-methylchinolingelb vorlag, ſondern das Zwischenprodukt, aus dem Blaufäure noch nicht abgeſpalten iſt.

4,021 mg Sbft.: 11,310 mg CO_2 , 1,480 mg H_2O .

$\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$:

53,65 mg Sbft.: 4,08 ccm N_2 ; $t = 23^{\circ}$; $p = 753$ mm.

Ber. C = 76,44% H = 4,45% N = 8,91%.

Gef. C = 76,67% H = 4,19% N = 8,69%

3,569 mg: 2,77 mg AgJ.

Ber. $=\text{NCH}_3 = 4,78\%$.

Gef. $=\text{NCH}_3 = 4,96\%$.


γ -Isomeres des N-Methylchinolingelb

(Aus 4-Cyanchinolinjodmethylat und Indandion).

Zur Syntheſe des γ -Homeren des N-Methylchinolingelb wird der gleiche Anſatz wie bei dem vorigen Verſuch angewandt, aber es wird 4—5 Stunden auf dem Waſſerbad erhitzt. Die anfänglich ausgefallenen Kristalle des Zwischenproduktes gehen dabei allmählich in Löſung. Beim Stehen über Nacht ſcheiden ſich rotorange Kriſtällchen aus. Sie werden abgefaugt, mit Alkohol nachgewaſchen und zweimal aus Pyridin umkriſtallifert. Die ſo erhaltene Verbindung iſt in jeder Hinſicht identiſch mit dem aus Chinolinjodmethylat und Indandion und Alkali erhaltenen Stoff. Der Miſchſchmelzpunkt

zeigt keine Depression. Es wurde auch noch eine Stickstoff-Bestimmung durchgeführt, die ebenfalls stimmenden Wert ergab und die Verschiedenheit von dem Zwischenprodukt deutlich zeigte. (Gef. 5,14%N, Ber. 4,89%, Zwischenprodukt: Gef. 8,69%N, Ber. 8,91%N.) Der Mischschmelzpunkt mit dem Zwischenprodukt ergab eine Depression von 30°. Besonders deutlich ist der Unterschied in der Halochromieerscheinung mit konc. Schwefelsäure: Bei der hier erhaltenen Verbindung violettrot, beim Zwischenprodukt gelb.

N-Methyl-nitromethylendihydrochinolin.




2,5 g Chinolinjodmethylat wurde in wenig Methanol gelöst und eine Lösung von 0,61 g Nitromethan und 0,57 g Kaliumhydroxyd in 25 ccm Methanol hinzugegeben. Nach dreitägigem Stehen hatten sich braungelbe Kristalle abgetrennt. Dieselben wurden abfiltriert, mit Alkohol gewaschen und aus heißem Wasser umkristallisiert.

Schöne gelbe Nadeln von Smp. 211°. In kaltem Wasser schwer, leicht in heißem Wasser löslich, gut löslich in heißem Alkohol, löslich in Eisessig, mäßig löslich in Benzol, wenig in Äther, in konc. Schwefelsäure Zersetzung.

4,974 mg: 11,890 mg CO₂, 2,240 mg H₂O
 5,372 mg: 12,870 mg CO₂, 2,320 mg H₂O
 2,739 mg: 0,314 mg N₂, t = 24°, p = 769 mm.

C₁₁H₁₀O₂N₂: Ber. C = 65,35% H = 4,95% N = 13,80%.
 Gef. C = 65,29% H = 5,03% N = 13,40%.
 C = 65,33% H = 4,83% —

Versuch zur Kondensation von Cyanessigester mit Chinolinjodmethylat.



2,5 g Chinolinjomethylat wurde in wenig Methanol gelöst und eine Lösung von 1,13 g Cyanessigester und 0,57 g Kaliumhydroxyd in 25 ccm Methanol hinzugegeben. Nach einer Woche hatten sich orangerote Kristalle ausgeschieden. Sie wurden abgeseigt und mit Methanol gewaschen. Beim Erhitzen mit Methanol blieb eine farblose kristalline Substanz ungelöst. Aus der orangeroten methylalkoholischen Lösung schieden sich beim Abkühlen gelborangefarbene Kristalle aus vom Smp. 149—52°. In Wasser kaum löslich; wenig in kaltem, leichter in heißem Alkohol löslich; in Äther unlöslich, in Benzol mäßig löslich, löslich in Eisessig und in Pyridin.

21,42 mg Subst.: 2,10 ccm N₂, t = 24°, p = 759.

C₁₅H₁₄O₂N₂: Ber. N = 11,00%.

Gef. N = 11,23%.

Die farblose kristalline Substanz ließ sich aus Chloroform und Methanol umkristallisieren und zeigte dann den Smp. 194—95°. Beim mehrtägigen Stehen an der Luft wurde sie allmählich oxydiert, wobei der Schmelzpunkt sank. Vermutlich lag das Äthan vor, das durch Dehydrierung allmählich in das gelbe Äthylen überging.

Versuch zur Kondensation von Malonester mit Chinolinjodmethylat.

5,5 g Chinolinjodmethylat wurden in 25 ccm Methanol gelöst und zu dieser Lösung eine solche von 3,2 g Malonester und 2 g Kaliumhydroxyd in 25 ccm Methanol hinzugegeben. Nach dreiwöchigem Stehen hatten sich messingglänzende Kristalle ausgeschieden; die Lösung war intensiv rot. Aus Methanol oder heißem

Wasser ließ sich die Substanz umkristallisieren und zeigte dann einen Schmelzpunkt von $235-36^{\circ}$ unter Zersetzung. In Benzol und in Äther spurenweise löslich; sehr wenig löslich in kaltem, leichter in heißem Wasser; löslich in Alkohol, Eisessig, Pyridin. Die Farbe der Lösungen ist rot bis violettrot. In konc. Schwefelsäure fast farblos löslich.

Eigenschaften und Analyseergebnisse zeigen, daß sich Dimethyl-crythroapocyaninhydrojodid ¹⁴⁾ ¹⁵⁾ mit ein Mol Kristallwasser gebildet hat.

27,79 mg: 56,52 mg CO₂, 12,76 mg H₂O.

44,08 mg: 2,53 ccm N₂, t = 22° C, p = 767.

43,2 mg: 23,3 mg AgJ.

144,0 mg: 5,5 mg Gewichtsverlust bei 120—25°.


C₂₀H₁₉N₂J · H₂O: Ber. C = 55,57%, H = 4,86%, N = 6,48%,
J = 29,40%.

Gef. C = 55,47%, H = 5,14%, N = 6,68%,
J = 29,16%.

Ber. H₂O = 4,17%.

Gef. H₂O = 3,82%.

γ-Phthaloylmethylen-N-methyl-dihydrochinaldin.



Zu einer Lösung von 5 g N-Methylchinaldinium-methylsulfat in Methanol werden 3 g Indandion und 2 g Kaliumhydroxyd in 25 ccm Methanol gelöst zugegeben, und das Ganze einige Tage stehen gelassen. Nach dieser Zeit hat sich eine rotorange kristalline Masse

ausgeschieden. Sie wird abfiltriert, mit Methanol ausgewaschen und aus Pyridin umkristallisiert.

Orange gelbe Nadeln. Smp. 285—90°. Unlöslich in Wasser, kaum löslich in Äther, etwas löslich in Benzol, ziemlich löslich in Alkohol, Eisessig, Pyridin, Chloroform. Die Farbe der Lösung ist orangegelb bis orangerot. In konc. Schwefelsäure violettrote Halochromie.


31,14 mg: 1,32 ccm N₂, t = 19°, p = 755 mm.

C₂₀H₁₀O₂N.

Ber. N = 4,65%.

Gef. N = 4,83%.

γ-Isomeres des N-Methylpyridingelb.



2,22 g Pyridinjodmethylat, 1,46 g Indandion und 0,56 g Kaliumhydroxyd werden in etwa 30 ccm Methanol gelöst und 15 Stunden lang auf dem Wasserbad erhitzt. Dabei fällt eine grün-gelbe Masse aus. Durch Umkristallisieren aus Eisessig werden gelbe Nadeln von Smp. 353—54° erhalten.


Die Verbindung ist unlöslich in Wasser, kaum löslich in Äther, etwas löslich in Benzol, löslich in Alkohol, Eisessig, Pyridin, Chloroform. Die Farbe der Lösungen ist gelb bis gelborange. Mit konc. Schwefelsäure violettrote Halochromie.

36,98 mg: 102,51 mg CO₂, 15,58 mg H₂O.

C₁₅H₁₁O₂N: Ber. C = 75,95%, H = 4,64%.

Gef. C = 75,79%, H = 4,73%.

Phenylmethylpyrazolonyliden-N-methyldihydropyridin (γ ?)



3,4 g Phenylmethylpyrazolon und 2,2 g Kaliumhydroxyd werden in 40 ccm Methanol gelöst und diese Lösung zu einer solchen von 4,4 g Pyridinjodmethylat gegeben. Im Laufe von zwei Monaten scheiden sich schöne lange gelbe Nadeln aus. Sie werden abgeseugt, mit Methanol ausgewaschen und aus Pyridin umkristallisiert. Ausbeute 75%.

Gelbe Nadeln. Smp. 255°. Unlöslich in Wasser und in Äther, etwas löslich in Benzol, löslich in Alkohol, Eisessig, Pyridin, Chloroform. Die Farbe der Lösungen ist gelb. In konc. Schwefelsäure farblose Lösung, beim Eingießen in Wasser bleibt die Lösung farblos. Auf Zusatz von Ammoniak fällt das gelbe Produkt wieder aus.

30,41 mg: 80,43 mg CO₂, 15,16 mg H₂O.

43,32 mg: 6,14 ccm N₂, t = 23°, p = 753 mm.

C₁₆H₁₅ON₃: Ber. C = 72,45%, H = 5,66%, N = 15,85%.

Gef. C = 72,15%, H = 5,55%, N = 16,15%.

Versuch zur Darstellung von C-Methylchinophthalon.

(1) Chlorchinolin (0,001 Mol.) und 0,001 Mol. Methylindandion werden mit einer Lösung von 0,001 Mol. Natriumalkoholat in 10 ccm absolutem Methanol 10 Stunden unter Rückfluß auf dem Wasserbad erhitzt (Feuchtigkeitsabfluß). Sodann wurde das Reaktionsgemisch mit Essigsäure angeäuert. Auf Wasserzuzatz schied sich ein Öl aus, welches in Äther aufgenommen wurde. Nach dem Trocknen und Einengen schieden sich farblose Kristalle aus, die, wie der Mischschmelzpunkt zeigte, Chlorchinolin waren. Ein Umsatz hatte also nicht stattgefunden.

Ein Versuch mit Kaliummetholat zeitigte das gleiche negative Ergebnis.

(2) 0,2 g Methylindandionkalium und 0,2 g 2-Chlorchinolin wurden mit 0,002 g Kupferpulver im Ölbad drei Stunden auf 180° erhitzt. Die Schmelze, eine schwarzbraune kohlige Masse, wurde mit Alkohol extrahiert und die alkoholische Lösung mit Wasser versetzt. Es schied sich ein Öl aus, das als Chlorchinolin identifiziert wurde. In der Lösung ließ sich unverändertes Methylindandionkalium mit Silbernitrat in Form eines rotfarbenen Silberfalzes nachweisen.

Die Wiederholung des Versuches bei etwas höherer Temperatur (220°) führte nur zu einem völlig verkohlten Produkt.

(3) 300 mg. Chlorchinolin, 300 mg Methylindandionkalium wurden 10 ccm 0,5%igem methylalkoholischem Kali mit etwas Kupferpulver 14 Stunden auf dem Wasserbad unter Rückfluß erhitzt. Bei der Aufarbeitung wurden aber nur die unveränderten Ausgangsmaterialien wiedererhalten.

Auch beim Erhitzen von Chlorchinolin und Methylindandionnatrium in Pyridin und in Xylol konnte ein Umsatz nicht festgestellt werden.

(4) 400 mg 2-Chlorchinolin und 450 mg Methylindandionnatrium wurden in 3 ccm Methanol 7 Stunden lang im Bombenrohr auf 160—70° erhitzt. Dabei hatten sich schöne lange, fast farblose Prismen gebildet. Nach dem Umkristallisieren aus heißem Wasser waren sie völlig farblos geworden und zeigten einen Smp. von 196°. Die Verbindung erwies sich als Carbostryl. Es hatte also lediglich eine Hydrolyse des Chlorchinolins eventuell unter vorheriger Bildung von Carbostrylmethyläther stattgefunden.


(5) 3,26 g Chlorchinolin und 3,64 g Methylindandionnatrium wurden vier Stunden lang im Bombenrohr mit 15 ccm Methanol auf 160° erhitzt; dann wurde das Ganze noch einen Tag stehen gelassen. Es hatten sich schwach gelbgefärbte Nadeln gebildet. Das Reaktionsgemisch wurde mit Wasser versetzt und die Nadeln abgelaugt. Sie wurden in Eisessig gelöst. Durch vorsichtigen Wassereinzufuß fiel die Verbindung wieder kristallin aus. Der abgelaugte wässerig-ölige Teil gab beim Anfäuern mit Essigsäure weitere

Mengen Öl. Aus diesen Anteilen war jedoch keine definierte Verbindung zu isolieren.

Der Versuch wurde nun wiederholt unter Anwendung von Cyanchinolin an Stelle des Chlorchinolins. Auch hier wurde die blaßgelbe Substanz vom Smp. 335° erhalten. Sie gab mit derjenigen des vorigen Versuchs keine Schmelzpunktserniedrigung.

Die Analysenwerte deuten darauf hin, daß dieser Stoff ein Selbstkondensat von 3 Mol. Methylindandion sein dürfte. Diese Frage wurde nicht näher untersucht.

2-Piperidinochinolin.



1,63 g Chlorchinolin und 3 ccm Piperidin wurden anderthalb Stunden im Ölbad auf 120—30° erhitzt. Dabei wird die ganze Masse fest. Man bewahrt sie einige Tage im Vacuumexsiccator über Schwefelsäure auf, sodaß die Reste von freiem Piperidin absorbiert werden. Dann extrahiert man mit Äther, wobei saures Piperidin ungelöst bleibt. Nach dem Abdunsten des Äthers bleibt eine blätterige Substanz zurück. Sie kann umkristallisiert werden durch Auflösen in Alkohol und Verfetzen mit Wasser bis zur eben bleibenden Trübung. Farblose Blättchen vom Smp. 55°. Leicht löslich in Alkohol und Äther, ziemlich löslich in kaltem, leicht in heißem Wasser.

3,5 mg: 0,346 ccm N₂, t = 22°, p = 754 mm.


C₁₄H₁₆N₂: Ber. N = 13,20%.

Gef. N = 13,00%.

Bei dem Umsatz von Cyanchinolin mit Piperidin unter den gleichen Bedingungen wird ebenfalls eine farblose in Blättchen kristallisierende Verbindung erhalten, die jedoch nach dem Umkristallisieren aus heißem Wasser einen Smp. von 129—130° zeigte. Diese

Verbindung erwies sich identisch mit Chinaldinsäure. Es hat also kein Umtausch der Cyangruppe durch den Piperidinorest, sondern eine glatte Verseifung stattgefunden (vermutlich durch primäre Addition von Piperidin unter Bildung eines Amidins).

2-Piperidinochinolinjodmethylat.



Aquimolekulare Mengen 2-Piperidinochinolin und Jodmethyl wurden in einer Druckflasche 4 Stunden lang im Wasserbad erhitzt. Das Reaktionsprodukt bildet nach dem Erkalten eine feste Masse. Es wird mit Äther ausgewaschen. Das feste Salz wird in Methanol gelöst und durch Zusatz von etwa des gleichen Volumens Äther kristallin niedergechlagen. Ganz schwachgelbe Kristalle, die bei 200° unter Zersetzung schmelzen. Leicht löslich in Wasser, Alkohol, Eisessig, Pyridin; unlöslich in Benzol und Äther.

38,61 mg: 70,68 mg CO₂, 18,46 mg H₂O.

$$\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{N}_2\text{J: Ber. C} = 50,85\%, \text{ H} = 5,36\%.$$

Gef. C — 50,55%, H — 5,35%.

Bromchinophthalon und Methylmagnesiumbromid.

Das Bromchinophtalon wurde nach den Angaben A. Eibners (Ann. 315, 340, 1901) dargestellt, doch wurde statt bei Zimmertemperatur das Brom bei 40—45° einwirken gelassen. Man erhält so ein reineres Produkt mit nahezu quantitativer Ausbeute.

Eine benzolische Lösung von Bromchinophtalon wurde zu einer ebenfalls benzolischen Lösung von Methylmagnesiumbromid gegeben und das Ganze zwei Tage auf dem Wasserbad erhitzt. Die anfänglich farblose Lösung färbte sich zuerst gelb und dann orangerot. Die Weiterverarbeitung, die genau so durchgeführt wird wie beim nächsten Versuch, ergibt auch hier N-Methylchinolingelb.

Chinolingelb und Methylmagnesiumbromid.

Von einer ätherischen Lösung von Methylmagnesiumbromid wurde der Äther abgedampft und durch Benzol ersetzt. Zu dieser Lösung wurde reines Chinolingelb in völlig trockenem Benzol gelöst zugegeben. Das Gemisch wurde 25 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Die Lösung wurde allmählich orangerot. Sodann wurde mit Eiswasser versetzt. Dabei schieden sich gelbe Flocken aus. Es wurde mit Salzsäure angeäuert, und die orangerote benzolische Lösung von den gelben Flocken und der wässerigen Flüssigkeit abgetrennt. Die gelben Flocken bestanden im wesentlichen aus unverändertem Chinolingelb. Die benzolische Lösung wurde mit geglühtem Natriumsulfat getrocknet und dann eingedampft. Der Rückstand, eine rote Masse, zeigte einen Smp. von 235° (unscharf). Nach mehrmaligem Umkristallisieren aus Chloroform und Methylalkohol stieg der Smp. auf 243°. Der Mischschmelzpunkt mit Chinolingelb zeigte eine Depression von etwa 10°, während mit N-Methylchinolingelb keine Depression eintrat. Das Produkt zeigte auch die Lösungsfarben des N-Methylchinolingelb. Es lag also ein etwas verunreinigtes N-Methylchinolingelb vor.

4-Piperidinochinolinjodmethyleat.

4-Chinolinjodmethyleat und Piperidin werden in äquimolekularer Menge im Ölbad auf 110° erhitzt. Dabei tritt plötzlich Reaktion ein, und die ganze Masse wird intensiv violettblau. Das Gemisch wird dann im Vacuumexsiccator aufbewahrt zur Entfernung des nicht umgesetzten Piperidins. Die dunkle Masse wird mit wenig Methylalkohol in der Kälte behandelt und die Lösung vom ungelösten dunklen zähen Öl abgegossen. Zur Lösung wird Äther gegeben; dadurch fällt ein kristalliner Körper in geringer Menge aus. Durch Umlösen aus Alkohol und Äther kann er weiter gereinigt werden.

Gelbe blätterige Kristalle, die erst über 300° schmelzen. In Wasser etwas löslich, ziemlich löslich in Alkohol. Die Lösungen sind gelb mit intensiver gelbgrüner Fluoreszenz.

Umsatz von 2-Chlorchinolin mit Indandion.

Äquimolekulare Mengen 2-Chlorchinolin und Indandion wurden mit 2 Mol. Natriummethylat in methylalkoholischer Lösung 8 Stunden im Bombenrohr auf 150—60° erhitzt. Aus dem Reaktionsprodukt wurde Bisindandion isoliert. Daneben wurden noch einige hochschmelzende Verbindungen vom Smp. 300°, 420° und noch höher gefaßt. Der Stoff vom Smp. 300° ist gelb und löste sich in Pyridin mit grüner Farbe. Das höchst schmelzende Produkt ist intensiv grün; es ist in den gebräuchlichen Lösungsmitteln unlöslich. Auf die nähere Untersuchung dieser Verbindungen wurde einstweilen verzichtet. Die Bildung von Chinolingelb wurde nicht beobachtet.

Lebenslauf:

Ich, Baboo Vanmalidas Mehta, wurde am 28. Februar 1911 in Khuntwada (Distrikt Mahuva, Kathiawar, Indien) geboren. Von 1916 bis 1922 besuchte ich die Vorschule, 1922 bis 1925 die Mittelschule in Savarkundla, 1925 bis 1929 die Manji Nathoobhai High School in Mahuva. 1929 bestand ich die Reifeprüfung, worauf ich mich dem Studium der Chemie, Physik und Mathematik an der Universität Bombay (St. Xavier's College) widmete. Am 27. Juni 1932 bestand ich das „Zwischenexamen“ der Universität Bombay. Im September 1932 kam ich nach Deutschland mit der Absicht, hier weiter zu studieren. Im Frühjahr 1933 bestand ich die Sprachprüfung im Deutschen Institut für Ausländer an der Universität Berlin. In Berlin wurde ich im Sommersemester 1933 immatrikuliert und studierte dort fünf Semester Chemie. Im Januar 1935 bestand ich das erste Verbandsexamen unter der Leitung des Herrn Professors Dr. W. Schlenck. Herbst 1935 bezog ich die Universität Bonn, wo ich im Wintersemester unter der Leitung des Herrn Prof. Dr. Dr. P. Pfeiffer das zweite Verbandsexamen bestand. Seitdem war ich mit der Anfertigung der vorliegenden Dissertation beschäftigt.

Tag der mündlichen Prüfung: 28. Juli 1937.
